




5. විද්‍යුත් සෘණතාවේ වැඩිම වෙනසක් ඇති මූලද්‍රව්‍ය යුගලය හඳුනාගන්න.  
 (1) B සහ Al      (2) Be සහ Al      (3) B සහ Si      (4) B සහ C      (5) Al සහ C

6.  $H_2NNO$  අණුවේ (සැකිල්ල:  $H-N^1-O-N^2$ ) නයිට්‍රජන් පරමාණු දෙක අවට ( $N^1$  සහ  $N^2$  ලෙස ලේබල් කර ඇත.) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය සහ හැඩය පිළිවෙළින් වනුයේ,

	$N^1$	$N^2$
(1) වතුස්තලීය	පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර කෝණීය
(2) පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර කෝණීය
(3) තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
(4) වතුස්තලීය	පිරමීඩාකාර	කෝණීය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
(5) වතුස්තලීය	කෝණීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර තලීය ත්‍රිකෝණාකාර

7. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරෙන් බෙන්සීන් පිළිබඳව වැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?  
 (1) බෙන්සීන්හි සම්ප්‍රයුක්ත මුහුම පහත දී ඇති ආකාරයට පෙන්වනු ලැබේ.



- (2) බෙන්සීන්හි කාබන් පරමාණු හයම  $sp^2$  මුහුම්කරණය වී ඇත.  
 (3) බෙන්සීන්හි ඕනෑම කාබන් පරමාණු දෙකක් අතර බන්ධන දිග එකම අගයක් ගනී.  
 (4) බෙන්සීන්හි සියළු  $C-C-C$  හා  $C-C-H$  බන්ධන කෝණවලට එකම අගයක් ඇත.  
 (5) බෙන්සීන්හි හයිඩ්‍රජන් පරමාණු සියල්ල ම එකම තලයක පිහිටයි.

8. ඉහළ උෂ්ණත්ව වලදී  $TiCl_4(g)$ , ද්‍රව මැග්නීසියම් ලෝහය  $[Mg(l)]$  සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර  $Ti(s)$  ලෝහය සහ  $MgCl_2(l)$  ලබා දේ.  $TiCl_4(g)$  0.95 kg හා  $Mg(l)$  97.2 g ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට සැලසූ විට, සම්පූර්ණයෙන් වැයවන ප්‍රතික්‍රියකය (මෙය සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වේ) සහ  $Ti(s)$  ලෝහය සෑදෙන ප්‍රමාණ පිළිවෙළින් වනුයේ,

(මවුලික ස්කන්ධය :  $TiCl_4 = 190 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $Mg = 24.3 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $Ti = 48 \text{ g mol}^{-1}$ )

- (1)  $TiCl_4$  සහ 96 g      (2) Mg සහ 96 g      (3) Mg සහ 48 g  
 (4)  $TiCl_4$  සහ 192 g      (5) Mg සහ 192 g

9. පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය,  $P = \rho \frac{RT}{M}$  ආකාරයෙන් දැක්විය හැක. මෙහි p යනු වායුවෙහි ඝනත්වය ද, M යනු වායුවේ මවුලික ස්කන්ධය ( $\text{g mol}^{-1}$ ) ද, P යනු පීඩනය (Pa) හා T යනු උෂ්ණත්වය (K) ද වේ. R හි ඒකක  $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$  නම්, සමීකරණයෙහි  $\rho$  හි ඒකක විය යුතු වන්නේ,

- (1)  $\text{kg m}^{-3}$       (2)  $\text{g m}^{-3}$       (3)  $\text{g cm}^{-3}$   
 (4)  $\text{g dm}^{-3}$       (5)  $\text{kg cm}^{-3}$

10. පහත සඳහන් ජලීය ද්‍රාවණයන්හි  $H_2O$  ද ඇතුළු ව සන්නායකතාව අඩුවන පිළිවෙළ වනුයේ,  
 0.01M KCl, 0.1M KCl, 0.1 M HAC ; (මෙහි HAC = ඇසිටික් අම්ලය ;  $M = \text{mol dm}^{-3}$ )

- (1)  $H_2O > 0.1M HAC > 0.1M KCl > 0.01 M KCl$   
 (2)  $0.01 M KCl > 0.1 M HAC > 0.1 M KCl > H_2O$   
 (3)  $0.01 M KCl > 0.1 M KCl > 0.1 M HAC > H_2O$   
 (4)  $0.1 M KCl > 0.01 M KCl > 0.1 M HAC > H_2O$   
 (5)  $0.1 M HAC > H_2O > 0.01 M KCl > 0.1 M KCl$


11. SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> සහ SCl<sub>2</sub> යන රසායනික විශේෂ, සල්ෆර් පරමාණුවේ (S) විද්‍යුත් සාණතාව වැඩිවන පිළිවෙළින් සැකසූ විට නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ,

- (1) SCl<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub> < SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>
- (2) SO<sub>3</sub> < SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> < SCl<sub>2</sub>
- (3) SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> < SCl<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub> < SO<sub>2</sub>
- (4) SCl<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub>
- (5) SCl<sub>2</sub> < SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> < SO<sub>2</sub> < SO<sub>3</sub>

12. පහත සඳහන් කුමන පිළිතුර, 25<sup>0</sup>C හි ඇති 1.775 mol dm<sup>-3</sup> MgCl<sub>2</sub> ජලීය ද්‍රාවණයක පැවැතිය හැකි උපරිම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ලබා දෙයි ද? මෙම උෂ්ණත්වයේ දී Mg(OH)<sub>2</sub> හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය 7.1 × 10<sup>-12</sup> mol<sup>3</sup> dm<sup>-9</sup> වේ.

- (1) 4.0 × 10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>                      (2) 2.0 × 10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>                      (3) 1.775 × 10<sup>-12</sup> mol dm<sup>-3</sup>
- (4) √7.1 × 10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>                      (5) 1.0 × 10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>

13. පහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රධාන ඵලය කුමක් ද?



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

14. පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශය හඳුනාගන්න.

- (1) NF<sub>3</sub> වල බන්ධන කෝණය NH<sub>3</sub> වල බන්ධන කෝණයට වඩා විශාල වේ.
- (2) 17 වන කාණ්ඩයේ (හෝ 7A) මූලද්‍රව්‍ය, ඔක්සිකරණ අවස්ථා -1 සිට +7 දක්වා පෙන්වුම් කරයි.
- (3) කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සල්ෆර්වල වඩාත් ම ස්ථායී බහුරූපී ආකාරය ඒකානකි සල්ෆර් වේ.
- (4) මිනිරන්වල ඝනත්වය දියමන්තිවල ඝනත්වයට වඩා වැඩි ය.
- (5) වායුමය අවස්ථාවේ දී ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් අශ්වක නියමය තෘප්ත කරයි.

15. Mn(s) | Mn<sup>2+</sup>(aq) || Br<sup>-</sup>(aq) | Br<sub>2</sub>(g) | Pt(s) විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයෙහි සම්මත විද්‍යුත්ගාමක බලය 2.27V වේ. Br<sub>2</sub>(g) | Br<sup>-</sup>(aq) හි සම්මත ඔක්සිහරණ විභවය 1.09V වේ. Mn<sup>2+</sup>(aq) | Mn(s) හි සම්මත ඔක්සිහරණ විභවය වනුයේ,

- (1) -3.36 V                      (2) -1.18 V                      (3) 0.59 V                      (4) 1.18 V                      (5) 3.36 V

16. ද්‍රවයක වාෂ්පීකරණයේ එන්තැල්පි වෙනස හා වාෂ්පීකරණයේ එන්ට්‍රොපි වෙනස පිළිවෙළින් 45.00 kJ mol<sup>-1</sup> හා 90.0 J K<sup>-1</sup> mol<sup>-1</sup> වේ. ද්‍රවයෙහි තාපාංකය වනුයේ,

- (1) 45.0 <sup>0</sup>C                      (2) 62.7 <sup>0</sup>C                      (3) 100.0 <sup>0</sup>C                      (4) 135.0 <sup>0</sup>C                      (5) 227.0 <sup>0</sup>C



17.  $C_6H_5N^+ \equiv NCl^-$  පිළිබඳව වැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) ඇනිලීන්,  $HNO_2(NaNO_2 / HCl)$  සමග  $0 - 5^\circ C$  දී ප්‍රතික්‍රියා කරවීමෙන්  $C_6H_5N^+ \equiv NCl^-$  ලබා ගත හැක.
- (2)  $C_6H_5N^+ \equiv NCl^-$ ,  $KI$  සමග ප්‍රතික්‍රියා කර අයඩොබෙන්සීන් ලබා දෙයි.
- (3)  $C_6H_5N^+ \equiv N$  අයනවලට ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි ය.
- (4)  $C_6H_5N^+ \equiv NCl^-$  හි ජලීය ද්‍රාවණයක් රත් කළ විට එය විශෝජනය වී බෙන්සීන් ලබා දෙයි.
- (5)  $C_6H_5N^+ \equiv NCl^-$  භාස්මික මාධ්‍යයේ දී ෆීනෝල සමග ප්‍රතික්‍රියා කර වර්ණවත් සංයෝග සාදයි.

18.  $H_2S(g), O_2(g)$  සමග ප්‍රතික්‍රියා කර එල ලෙස ජලවාෂ්ප  $[H_2O(g)]$  සහ  $SO_2(g)$  පමණක් ලබා දේ. නියත පීඩනයක දී සහ  $250^\circ C$  හි දී  $H_2S(g)$   $4 \text{ dm}^3$  හා  $O_2(g)$   $10 \text{ cm}^3$  ක් ප්‍රතික්‍රියා කළ විට මිශ්‍රණයේ අවසාන පරිමාව වනුයේ,

- (1)  $6 \text{ dm}^3$                       (2)  $8 \text{ dm}^3$                       (3)  $10 \text{ dm}^3$                       (4)  $12 \text{ dm}^3$                       (5)  $14 \text{ dm}^3$

19. රේඛනය කරන ලද දෘඩ බඳුනක් තුළට  $A(g)$  හා  $D(g)$  හි මිශ්‍රණයක් උෂ්ණත්වය  $T$  හි දී ඇතුළු කරන ලදී. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී  $A(g)$  හා  $D(g)$  යන දෙකම පහත දී ඇති මූලික ප්‍රතික්‍රියා අනුව විශෝජනය වේ.



බඳුනෙහි ආරම්භක පීඩනය  $P$ , ප්‍රතික්‍රියක දෙක සම්පූර්ණයෙන් ම විශෝජනය වූ පසු  $2.7 P$  දක්වා වෙනස් විය. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී  $A(g)$  හි විශෝජනයේ ආරම්භක ශීඝ්‍රතාවය වනුයේ, ( $R$  යනු සාර්වත්‍ර වායු නියතය වේ.)

- (1)  $1.7k_1 \left(\frac{P}{RT}\right)$                       (2)  $2.7k_1 \left(\frac{P}{RT}\right)$                       (3)  $0.09k_1 \left(\frac{P}{RT}\right)^2$
- (4)  $2.89k_1 \left(\frac{P}{RT}\right)^2$                       (5)  $7.29k_1 \left(\frac{P}{RT}\right)^2$

20. එක්තරා කාබනික සංයෝගයක් ( $X$ ) බ්‍රෝමීන් ජලය ( $Br_2/H_2O$ ) විච්චන කරයි.  $X$ , ඇමෝනියා  $CuCl$  සමග අවක්ෂේපයක් ලබා නොදෙයි.  $X$ , ආම්ලික  $K_2Cr_2O_7$  ද්‍රාවණයක් සමග පිරියම් කළ විට කොළ පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබේ.  $X$  විය හැක්කේ,

- (1)  $CH_3\overset{OH}{\underset{|}{CH}}CH_2C \equiv C - H$                       (2)  $CH_3\overset{OH}{\underset{|}{C}}CH_2C \equiv C - CH_3$                       (3)  $CH_3\overset{OH}{\underset{|}{CH}}CH_2CH \equiv CHCH_3$
- (4)  $HO - CH_2 - \overset{CH_3}{\underset{|}{CH}}C \equiv C - H$                       (5)  $CH_3\overset{OH}{\underset{|}{CH}}CH_2CH_2CH_2CH_3$

21.  $0.10 \text{ mol dm}^{-3}$  ඒකභාස්මික දුබල අම්ල ද්‍රාවණයක හා  $0.10 \text{ mol dm}^{-3}$  වූ එම අම්ලයෙහි සෝඩියම් ලවණයෙහි ද්‍රාවණයක සම පරිමා මිශ්‍ර කිරීමෙන්  $pH = 5.0$  වූ ස්ඵාරක්ෂක ද්‍රාවණයක් සාදා ඇත. මෙම ස්ඵාරක්ෂක ද්‍රාවණයෙන්  $20.00 \text{ cm}^3$  හා  $0.10 \text{ mol dm}^{-3}$  දුබල අම්ල ද්‍රාවණයෙන්  $90.00 \text{ cm}^3$  මිශ්‍ර කළ විට සෑදෙන ද්‍රාවණයෙහි  $pH$  අගය වනුයේ,

- (1) 3.0                      (2) 4.0                      (3) 4.5                      (4) 5.5                      (5) 6.0

22. පහත සඳහන් ජලීය ද්‍රාවණ තුන සලකන්න.

P - දුබල අම්ලයක්

Q - දුබල අම්ලයෙහි හා එහි සෝඩියම් ලවණයෙහි සමමවුලික මිශ්‍රණයක්

R - දුබල අම්ලයේ හා ප්‍රබල භස්මයක අනුමාපනයේ සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී ලැබෙන අනුමාපන මිශ්‍රණය

එක් එක් ද්‍රාවණය නියත උෂ්ණත්වයේ දී එකම ප්‍රමාණයෙන් තනුක කිරීමේ දී P, Q හා R හි  $pH$  අගයන් පිළිවෙලින්,

- (1) අඩු වේ, වැඩි වේ, වෙනස් නොවේ.                      (2) වැඩි වේ, වෙනස් නොවේ, අඩු වේ.
- (3) වැඩි වේ, වෙනස් නොවේ, වෙනස් නොවේ.                      (4) වැඩි වේ, වෙනස් නොවේ, වැඩි වේ.
- (5) වැඩි වේ, වැඩි වේ, වැඩි වේ.


23. ක්ලෝරීන් හි ඔක්සොඅම්ල වන HOCl, HClO<sub>2</sub>, HClO<sub>3</sub> හා HClO<sub>4</sub> පිළිබඳ වැරදි වගන්තිය වනුයේ,
- (1) HClO<sub>2</sub>, HClO<sub>3</sub> හා HClO<sub>4</sub> හි ක්ලෝරීන් වටා හැඩයන් පිළිවෙළින් කෝණික, පිරමීඩිය හා වකුස්තලීය වේ.
  - (2) HOCl, HClO<sub>2</sub>, HClO<sub>3</sub> හා HClO<sub>4</sub> හි ක්ලෝරීන්වල ඔක්සිකරණ අවස්ථා පිළිවෙළින් +1, +3, +5 හා +7 වේ.
  - (3) ඔක්සොඅම්ලවල අම්ල ප්‍රබලතාව HOCl < HClO<sub>2</sub> < HClO<sub>3</sub> < HClO<sub>4</sub> ලෙස වෙනස් වේ.
  - (4) මෙම ඔක්සොඅම්ල සියල්ලෙහි ම අඩු තරමින් එක් ද්විත්ව බන්ධනයක්වත් අඩංගු වේ.
  - (5) මෙම ඔක්සොඅම්ල සියල්ලෙහි ම අඩු තරමින් එක් OH කාණ්ඩයක්වත් අඩංගු වේ.

24. ආම්ලික ජලීය ද්‍රාවණයක 25<sup>0</sup>C හි දී ඝනත්වය 1.0 kg dm<sup>-3</sup> වේ. මෙම ද්‍රාවණයෙහි pH අගය 1.0 වේ නම් එහි H<sup>+</sup> සාන්ද්‍රණය ppm වලින් වනුයේ,
- (1) 0.1                      (2) 1                              (3) 100                              (4) 1000                              (5) 10,000

25. ඕසෝන් (O<sub>3</sub>) අඩංගු දූෂිත වායු සාම්පලයක 25.0 g, වැඩිපුර KI අඩංගු ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සමග පිරියම් කරන ලදී. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී ඕසෝන්, O<sub>2</sub> හා H<sub>2</sub>O බවට පරිවර්තනය වේ. මුක්ත වූ අයඩීන්, 0.002 mol dm<sup>-3</sup> Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී. අවශ්‍ය වූ Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> පරිමාව 25.0 cm<sup>3</sup> විය. වායු සාම්පලයේ ඇති O<sub>3</sub> හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය වනුයේ, (O = 16)
- (1) 4.8 × 10<sup>-3</sup>              (2) 6.4 × 10<sup>-3</sup>              (3) 9.6 × 10<sup>-3</sup>              (4) 1.0 × 10<sup>-2</sup>              (5) 3.2 × 10<sup>-2</sup>


26. NaCl(s) උත්පාදනයට අදාළ බෝන්-හේබර් වක්‍රයෙහි අඩංගු නොවන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රතික්‍රියා පියවර ද?
- (1) Na<sup>+</sup>(aq) + Cl<sup>-</sup>(aq) → NaCl(aq)      (2) Na(s) → Na(g)                              (3) Cl<sub>2</sub>(g) → 2Cl(g)
  - (4) Cl(g) + e → Cl<sup>-</sup>(g)                              (5) Na<sup>+</sup>(g) + Cl<sup>-</sup>(g) → NaCl(s)

27. A(g) + B(g) → C(g) යන මූලික ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සක්‍රියන ශක්තිය Ea වේ. M ලෝහය මගින් මෙම ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය වේ. උත්ප්‍රේරිත ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ශක්ති සටහන පහත දැක්වේ.



- මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමක් හැමවිටම සත්‍ය වේ ද?
- (1) Ea < E<sub>1</sub>                              (2) Ea = E<sub>1</sub> + E<sub>2</sub> + E<sub>3</sub> - ΔH<sub>1</sub>                              (3) Ea < E<sub>1</sub>, Ea < E<sub>2</sub> සහ Ea < E<sub>3</sub>
  - (4) Ea > E<sub>1</sub> + E<sub>2</sub>                              (5) Ea > ΔH<sub>1</sub> + E<sub>2</sub>

28. දුබල අම්ලයක් සඳහා,  $F = \frac{\text{අම්ලයෙහි විඝටනය වූ ප්‍රමාණය}}{\text{අම්ලයෙහි විඝටනය නොවූ ප්‍රමාණය}}$  ලෙස දැක්විය හැක. log F (ලඝ F) හා pH අගය අතර සම්බන්ධය දැක්වෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් ද?



29. බහු අවයවක පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) නයිලෝන් ආකලන බහුඅවයවිකයකි.
- (2) ටෙෆ්ලෝන් සංඝනන බහුඅවයවිකයකි.
- (3) බේක්ලයිට් රේඛීය බහුඅවයවිකයකි.
- (4) ස්වභාවික රබර්වල පුනරාවර්තන ඒකකයේ කාබන් පරමාණු 4ක් ඇත.
- (5) ඒකඅවයවක සම්බන්ධ වී සංඝනන බහුඅවයවක සෑදීමේ දී කුඩා සහසංයුජ අණු ඉවත් වේ.

30. එකිනෙක හා ප්‍රතික්‍රියා නොකරන පරිපූර්ණ වායූන් දෙකක් කපාටයක් මගින් වෙන් කර දෘඪ බඳුනක් තුළ තබා ඇත. මෙම පද්ධතිය නියත උෂ්ණත්වයක හා පීඩනයක පවත්වා ගනී. කපාටය විවෘත කළ පසු පද්ධතියෙහි ගිබ්ස් ශක්තිය, එන්තැල්පිය හා එන්ට්‍රොපියෙහි වෙනස්වීම් පිළිවෙළින් පහත කුමක් මගින් නිවැරදිව විස්තර වේ ද?

- (1) අඩු වේ, අඩු වේ, අඩු වේ. (2) අඩු වේ, අඩු වේ, වැඩි වේ.
- (3) අඩු වේ, වෙනස් නොවේ, වැඩි වේ. (4) අඩු වේ, වැඩි වේ, වැඩි වේ.
- (5) වැඩි වේ, වැඩි වේ, වැඩි වේ.

• අංක 31 සිට 40 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (a), (b), (c) හා (d) යන ප්‍රතිචාර අතුරෙන්, එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි ය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය / ප්‍රතිචාර කවරේ දැයි තෝරා ගන්න.

- (a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මත ද
  - (b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මත ද
  - (c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මත ද
  - (d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මත ද
- වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මත ද උත්තර පත්‍රයෙහි දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න.

ඉහත උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි යි	(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි යි	(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි යි	(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි යි	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි යි

31. ඔක්සිජන් සහ සල්ෆර් පරමාණු අඩංගු සරල සහසංයුජ අණු පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a) H<sub>2</sub>O උභයගුණී ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි.
- (b) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> වල තාපාංකය H<sub>2</sub>O හි තාපාංකයට වඩා ඉහළ ය.
- (c) ආම්ලික මාධ්‍යයකදී පමණක් H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> වලට ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැක.
- (d) H<sub>2</sub>S සහ SO<sub>2</sub> යන දෙකට ම හැකියාව ඇත්තේ ඔක්සිහාරක ලෙස ක්‍රියා කිරීමට පමණි.

32. හයිඩ්‍රොකාබන පිළිබඳව පහත දක්වා ඇති කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a) සියලු ම හයිඩ්‍රොකාබන වැඩිපුර O<sub>2</sub> සමග සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කළ විට CO<sub>2</sub> හා H<sub>2</sub>O ලබා දෙයි.
- (b) සියලු ම ඇල්කයින ශ්‍රිතාඩ් ප්‍රතිකාරක සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ඇල්කයිනයිල්ෆ්ග්න්තීසියම් හේලයිඩ් ලබා දෙයි.
- (c) අතු බෙදුණු ඇල්කේනයක තාපාංකය එම සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ම ඇති අතු නොබෙදුණු ඇල්කේනයක තාපාංකයට වඩා වැඩිය.
- (d) කිසිදු හයිඩ්‍රොකාබනයක් ජලීය NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.


33. තාපඅවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් නියත උෂ්ණත්වයේ දී හා පීඩනයේ දී ස්වයංසිද්ධව සිදු වේ නම් එවිට,

- (a) පද්ධතියෙහි එන්තැල්පිය අඩු වේ. (b) පද්ධතියෙහි එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ.
- (c) පද්ධතියෙහි එන්තැල්පිය වැඩි වේ. (d) පද්ධතියෙහි එන්ට්‍රොපිය වෙනස් නොවේ.

34. ලෝහ අයන, ඒවායේ ජලීය ද්‍රාවණවලට  $H_2S(g)$  යැවීමෙන් අවක්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a)  $H_2S(g)$  හි පීඩනය අඩු කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ.
- (b) උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වේ.
- (c) ද්‍රාවණයට  $Na_2S(s)$  එකතු කිරීම, ද්‍රාවණය වූ  $H_2S(aq)$  හි විඝටනය අඩු කරයි.
- (d) ද්‍රාවණයෙහි pH අගය වැඩි කිරීම, සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරයි.

35. පහත දැක්වෙන ඒවායින් නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් / ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ කුමක් ද? / කුමන ඒවා ද?



36. වායුගෝලයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම ඉහළයාම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a) එය මුහුදු ජලයේ ආම්ලිකතාව ඉහළයාමට දායක වේ.
- (b) එය ජල පද්ධතිවල කඩිනත්වය අඩු කරයි.
- (c) එය සූර්යාගෙන් පැමිණෙන UV කිරණ ප්‍රබලව අවශෝෂණය කරයි.
- (d) එය අම්ල වැසිවලට දායක නොවේ.

37. 3d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයන් සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a) 3d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය අතුරින් ඉහළම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය Zn වලට ඇත.
- (b) ප්‍රධාන කාණ්ඩයේ (s හා p ගොනු) බොහෝ මූලද්‍රව්‍යවල අයන මෙන් නොව 3d-ගොනුවේ ලෝහ අයන උච්ච වායු වින්‍යාසය ලබා ගන්නේ කලාතුරකිනි.
- (c) 3d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් ඍණතාවයන් අනුරූප s-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් ඍණතාවයන්ට වඩා වැඩි නමුත්, ඒවායේ පරමාණුක අරයන් අනුරූප s-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක අරයන්ට වඩා අඩුවේ.
- (d) අවර්ණ සංයෝග සාදන 3d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ Ti සහ Zn ය.


38. සංකාප්ත වාෂ්ප පීඩන  $P_A^0$  හා  $P_B^0$  වන ( $P_A^0 \neq P_B^0$ ) A හා B වාෂ්පශීලී ද්‍රව පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක් සාදයි. සංවෘත බඳුනක් තුළ A හා B ද්‍රවයන්හි මිශ්‍රණයක් ඒවායේ වාෂ්ප කලාපය සමග සමතුලිතව ඇත. බඳුනෙහි පරිමාව වැඩි කර එම උෂ්ණත්වයේ දී ම සමතුලිතතාවය නැවත ස්ථාපිත වූ පසු පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a) A හා B යම් ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප කලාපයට යන අතර ද්‍රව කලාපයෙහි සංයුතිය නොවෙනස්ව පවතී.
- (b) A හා B යම් ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප කලාපයට යන අතර වාෂ්ප කලාපයෙහි සංයුතිය නොවෙනස්ව පවතී.
- (c) A හා B යම් ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප කලාපයට යන අතර ද්‍රව කලාපයෙහි සංයුතිය වෙනස් වේ.
- (d) A හා B යම් ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප කලාපයට යන අතර වාෂ්ප කලාපයෙහි සංයුතිය වෙනස් වේ.

39. දුබල අම්ලයක ජලීය ද්‍රාවණයක් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

- (a) දුබල අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය අඩුවන විට ද්‍රාවණයෙහි සන්නායකතාව වැඩිවේ.
- (b) උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට ද්‍රාවණයෙහි සන්නායකතාව වැඩි වේ.
- (c) ද්‍රාවණයට වැඩිපුර ජලය එකතු කිරීමේ දී ද්‍රාවණයෙහි සන්නායකතාව අඩුවන නමුත් දුබල අම්ලයෙහි විඝටනය වූ භාගය වැඩි වේ.
- (d) දුබල අම්ල ද්‍රාවණයෙහි  $NaCl(s)$  ද්‍රවණය කළ විට, සන්නායකතාව අඩු වේ.

40. A සංයෝගය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?



- (a) A ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි.
- (b) A ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වයි.
- (c) A පිරිඩිනියම් ක්ලෝරොක්‍රෝමේට් (PCC) සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන ඵලය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි.
- (d) A පිරිඩිනියම් ක්ලෝරොක්‍රෝමේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන ඵලය ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වයි.

• අංක 41 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ප්‍රකාශ දෙක බැගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ප්‍රකාශ යුගලයට හොඳින් ම ගැළපෙනුයේ පහත වගුවෙහි දැක්වෙන පරිදි (1), (2), (3), (4) සහ (5) යන ප්‍රතිචාරවලින් කවර ප්‍රතිචාරය දැ'යි තෝරා උත්තර පත්‍රයෙහි උචිත ලෙස ලකුණු කරන්න.

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
(1)	සත්‍ය වේ.	සත්‍ය වන අතර, පළමුවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදි ව පහදා දෙයි.
(2)	සත්‍ය වේ.	සත්‍ය වන නමුත් පළමුවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදි ව පහදා නොදෙයි.
(3)	සත්‍ය වේ.	අසත්‍ය වේ.
(4)	අසත්‍ය වේ.	සත්‍ය වේ.
(5)	අසත්‍ය වේ.	අසත්‍ය වේ.

	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
41.	හැලජන අතුරෙන්, I <sub>2</sub> සහයක් වන අතර Br <sub>2</sub> ද්‍රවයකි.	අණුක පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය වැඩිවීමත් සමග ලන්ඩන් බල වඩා ප්‍රබල වේ.
42.	දෙන ලද පීඩනයක දී උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමග, N <sub>2</sub> සහ H <sub>2</sub> ප්‍රතික්‍රියා කර NH <sub>3</sub> සෑදෙන ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාව පහල බසී.	NH <sub>3</sub> ලබාදෙන N <sub>2</sub> සහ H <sub>2</sub> අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස සෘණ වේ.
43.	සගන්ධ තෙල්, ශාකමය ද්‍රව්‍යවලින් සාමාන්‍යයෙන් නිස්සාරණය කරන්නේ හුමාල ආසවනය මගින් ය.	සගන්ධ තෙල්වලට ජලයේ ඉහල ද්‍රාව්‍යතාවයක් ඇත.
44.	ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා තත්ත්වයන් කුමක් වුවත් සැමවිටම සෘණ ශිඛ්‍ය ශක්ති වෙනසක් ඇත.	ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන දිශාව පුරෝකථනය කිරීම සඳහා ශිඛ්‍ය ශක්ති වෙනස භාවිත කළ හැකි වන්නේ නියත උෂ්ණත්ව හා නියත පීඩන තත්ත්ව යටතේ දී පමණි.
45.	1-බියුටනෝල්හි ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය මෙතනෝල්හි ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවයට වඩා අඩුය.	ධූවීය OH කාණ්ඩයට සාපේක්ෂව නිර්ධූවීය ඇල්කයිල් කාණ්ඩයේ විශාලත්වය වැඩි වීමත් සමග මධ්‍යසාරවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය අඩු වේ.
46.	$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_3 - \underset{\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$ ප්‍රතික්‍රියාව, නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි.	ද්විතියික කාබොකැටායනයක් ප්‍රතික්‍රියා අතරමැදියක් ලෙස පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියාවේ දී සෑදේ. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_3 - \underset{\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
47.	කාර්මික ක්‍රියාවලි කිහිපයකම කෝක් (Coke) භාවිත වේ.	කාර්මික කෝක් (Coke) භාවිත වන්නේ ඉන්ධනයක් ලෙස පමණි.
48.	කීටෝනයක කාබනයිල් කාබන් පරමාණුව සහ එයට බන්ධනය වූ අනෙකුත් පරමාණු එකම තලයක පිහිටයි.	කීටෝනයක කාබනයිල් කාබන් පරමාණුව sp <sup>2</sup> මුහුම්කරණය වී ඇත.
49.	එකම උෂ්ණත්වයේ දී ඕනෑම පරිපූර්ණ වායූන් දෙකකට එකම මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තීන් ඇත.	දෙන ලද උෂ්ණත්වයක දී වායු අණුවල මධ්‍යන්‍ය වේගය ඒවායේ ස්කන්ධය අනුව සැකසේ.

50.	CFC ඕසෝන් වියන භායනයට දායක වූවන් HFC වල දායකත්වය නොගිණිය හැකි තරම් කුඩාය.	ඉහළ වායුගෝලයට ළඟාවීමට පෙර HFC සම්පූර්ණයෙන් ම වියෝජනය වෙයි.
-----	---	--

\*\*\*