

1. තුන්වන අයනීකරණ එන්තැල්පිය උපරිම වන්නේ,
 (1) Al හිස. (2) Si හිස. (3) S හිස. (4) Mg හිස. (5) Ar හිස.

2. ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් $\left(\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H} \right)$ හි කාබොනයිල් කාබන්වල ඔක්සිකරණ අංකය වනුයේ,
 (1) +2 (2) 0 (3) +1 (4) -1 (5) -2

3. සංයෝගවල අම්ල ප්‍රබලතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ නිවැරදි ව දක්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පටිපාටිය ද?

- (1) $\text{H}_2\text{O} < \text{CH}_3\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
 (2) $\text{CH}_3\text{OH} < \text{H}_2\text{O} < \text{CH}_3\text{COOH} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
 (3) $\text{H}_2\text{O} < \text{CH}_3\text{OH} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH}$
 (4) $\text{CH}_3\text{OH} < \text{H}_2\text{O} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH}$
 (5) $\text{H}_2\text{O} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH}$

4. ආවර්තිතා වගුවේ V වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩි වන විට සිදු නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

- (1) ලෝමහය ලක්ෂණ වැඩි වීම. (2) ඔක්සයිඩ වඩා ආම්ලික වීම.
 (3) හයිඩ්‍රයිඩ අඩුවෙන් භාෂ්මික වීම. (4) හයිඩ්‍රයිඩ වඩා ඔක්සිහාරක වීම.
 (5) ඔක්සි අම්ලවල ආම්ලිකතාවය අඩු වීම.

5. සංයෝගවල හෂ්ම ප්‍රබලතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ නිවැරදිව දක්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පටිපාටියෙන් ද?

- (1) -NH₂ < CH₃CONH₂ < CH₃NH₂ < NH₃
 (2) CH₃CONH₂ < -NH₂ < NH₃ < CH₃NH₂
 (3) NH₃ < CH₃CONH₂ < CH₃NH₂ < -NH₂
 (4) CH₃NH₂ < NH₃ < CH₃CONH₂ < -NH₂
 (5) CH₃CONH₂ < CH₃NH₂ < -NH₂ < NH₃

6. වාෂ්පශීලී ද්‍රව, දෙකකින් සෑදෙන පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සඳහා වන පහත ප්‍රකාශ අතුරින් වැරදි වන්නේ කුමන එකද?

- (1) දෙන ලද සංයුතියකින් යුත් පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක සම්මත තාපාංකය නියත වේ.
- (2) පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක් ආසවනය කරන විට, එහි තාපාංකය කාලයක් සමඟ වෙනස් වේ.
- (3) පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ පැවතිය හැක්කේ සීමිත සංයුති පරාසයක් තුළ පමණි.
- (4) සියලුම පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ රවුල් නියමය අනුගමනය කරයි.
- (5) පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක තාපාංකය, සංශුද්ධ සංඝටක දෙකෙහි තාපාංක දෙක අතර පිහිටයි.

7. H_2O_2 ඔක්සිහාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන සංයෝග සමඟ ද?

- (1) H_2S (2) KI (3) $FeSO_4$ (4) SO_2 (5) Ag_2O

8. පහත දැක්වෙන සංයෝග අතුරින් වැඩිම ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණයක් ඇත්තේ කුමන සංයෝගයට ද?

- (1) සිස් $ClCH = CHCl$ (2) CO_2 (3) $Cl_2C = CCl_2$
- (4) CCl_4 (5) ප්‍රාන්ස් $ClCH = CHCl$


9. උණු ජලයේදී අවරණ ද්‍රාවණයක් දෙන වර්ණවත් ලවණය වනුයේ ?

- (1) $KMnO_4$ (2) $FeCl_3$ (3) KI (4) PbI_2 (5) $CuSO_4$

10. සර්වසම විදුරු බුබුලු දෙකකින් එකක් පරිපූර්ණ වායුවක X මවුලවලින් ද, අනෙක තාත්වික වායුවක X මවුලවලින් ද පිරී ඇත. මෙම වායුන් පිළිබඳ ව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වීමට අඩුවෙන්ම ඉඩ ඇත්තේ කුමක් ද?

- (1) ද්‍රවීකරණය සිදු නොවන ඕනෑම උෂ්ණත්වයක දී වායු දෙකෙහි පරිමා සම වේ.
- (2) එකම උෂ්ණත්වයක දී පරිපූර්ණ වායුවේ පීඩනය, තාත්වික වායුවේ පීඩනයට වඩා කිසිවිටෙක අඩු විය නොහැක.
- (3) වායු දෙකෙහි පීඩන, යම් උෂ්ණත්වවල දී සමවිය හැකිය.
- (4) වායු දෙකෙහි සම්පීඩ්‍යතාවන්, යම් උෂ්ණත්වවල දී සමවිය හැකිය.
- (5) ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදී වායු දෙකෙහි වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේග සමාන වේ.

11. පහත දැක්වෙන කාබොකැටායන සලකන්න.



ඉහත කාබොකැටායනවල ස්ථායීතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදි ව දැක්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පටිපාටිය ද?

- (1) $III < I < II < IV$ (2) $III < I < IV < II$ (3) $IV < II < I < III$
- (4) $I < II < III < IV$ (5) $II < IV < I < III$

12. පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේද?

- (1) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළ ඇති මූලද්‍රව්‍ය වඩාත් ම ඔක්සිහාරක වේ.
- (2) Zn, FeSO₄ ද්‍රාවණයකින් , Fe විස්ථාපනය කරයි.
- (3) Cl₂, KIO₃ ද්‍රාවණයකින් , I₂ මුක්ත කරයි.
- (4) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ H වලට ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය, අම්ලවලින් H₂(g) මුක්ත කරයි.
- (5) සංයෝගයක ඇති මූලද්‍රව්‍යයක ඔක්සිකරණ තත්ත්වය ශුන්‍යය විය හැකිය.

13. ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් , ක්ලෝරීන් සහ නියෝන යන මේවායේ පරමාණුවල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිවල ΔH_f⁰ නිවැරදි පටිපාටිය වන්නේ,

- (1) Cl < Ne < N < O
- (2) Cl < N < O < Ne
- (3) O < Ne < Cl < N
- (4) O < N < Ne < Cl
- (5) Ne < Cl < O < N

14. පහත සඳහන් ඒවායින් , CrO₄²⁻ සහ Cr₂O₇²⁻ යන අයන පිළිබඳ ව සත්‍ය නොවන්නේ කුමන ප්‍රකාශද?

- (1) දෙකෙහිම ඉහළම ඔක්සිකරණ තත්ත්වය සහිත Cr අන්තර්ගත වේ.
- (2) දෙකෙන් ම, I⁻, I₂ බවට ඔක්සිකරණය වේ.
- (3) ජලීය ද්‍රාවණයේ දී ඒවා එකිනෙක සමඟ සමතුලිතව පවතී.
- (4) දෙක ම NH₄OH සමඟ අවක්ෂේප දෙයි.
- (5) SO₂ මඟින් දෙක ම Cr³⁺ බවට ඔක්සිහරණය වේ.

15. $CH_4 \xrightarrow[\text{ආලෝකය}]{Cl_2} CH_3Cl$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ CH₃Cl අස්වැන්න සඳහා වැඩිම වශයෙන් දායක

වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර පියවරද?

- (1) CH₃⁺ + Cl⁻ → CH₃Cl
- (2) CH₃[•] + Cl₂ → CH₃Cl + Cl[•]
- (3) CH₃[•] + Cl[•] → CH₃Cl
- (4) CH₃⁺ + Cl₂ → CH₃Cl + Cl⁺
- (5) Cl[•] + CH₄ → CH₃Cl + H[•]


16. ආවර්තිතා වගුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේ ද?

- (1) එක සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇති සෑම මූලද්‍රව්‍යයක් ම ලෝහ වේ.
- (2) IV වන කාණ්ඩයේ, ලෝහ මෙන්ම ආලෝහ ද ඇත.
- (3) III වන කාණ්ඩයේ බොහෝ මූලද්‍රව්‍ය ලෝහ වේ.
- (4) 3d – ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ලෝහ වේ.
- (5) කාමර උෂ්ණත්වයේ දී වායු වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය ද ද්‍රව වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය ද සහ වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය ද VII වැනි කාණ්ඩයේ අන්තර්ගත වේ.

17. P, Q, R සහ S යනු පිළිවෙළින් පිරිසිදු ජලය, ජලීය සිනී ද්‍රාවණයක්, ඊතර් සහ ජලය සමඟ මිශ්‍රණයක්, පොල් තෙල් සහ ජලය මිශ්‍රණයක් වේ. P, Q, R සහ S යන මේවායේ තාපාංකවල නිවැරදි පටිපාටිය වනුයේ,

- (1) P < Q < R < S
- (2) R < S < Q < P
- (3) R < S < P < Q
- (4) Q < P < R < S
- (5) P < S < Q < R

23. NaOH යූරියා සමඟ පහත දැක්වෙන ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



යූරියා (යූරියාවල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය = 60.0) 0.6 g ක්, 1.0 moldm⁻³ NaOH, 25.0 cm³ සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලදී. නැටවීමෙන් NH₃ මුළුමනින්ම ඉවත් කරන ලදී. මෙසේ ලැබෙන ද්‍රාවණය උදාසීන කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන 0.5 moldm⁻³ HCl පරිමාව වන්නේ,

- (1) 10.0 cm³ (2) 12.5 cm³ (3) 20.0 cm³ (4) 25.0 cm³ (5) 50.0 cm³

24. NO₂, NO₂⁻ සහ NO₂⁺ යන විශේෂ සඳහා බන්ධන කෝණයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වන්නේ,

- (1) NO₂⁻ > NO₂ > NO₂⁺ (2) NO₂⁺ > NO₂ > NO₂⁻
 (3) NO₂⁻ > NO₂ = NO₂⁺ (4) NO₂⁻ > NO₂⁺ > NO₂
 (5) NO₂⁺ > NO₂⁻ > NO₂

25. Ammonium aquapentafluoroferrate(III) හි ව්‍යුහ සූත්‍රය වන්නේ,

- (1) (NH₄) [Fe(H₂O) F₅] (2) (NH₄) [Fe(H₂O)₅F]
 (3) (NH₄)₂ [Fe(H₂O) F₅] (4) (NH₄)₂ [Fe(H₂O)₅F]
 (5) [Fe(NH₃) (H₂O) F₅]

26. සංචාත බඳුනක් තුළ 3 atm පීඩනයකින් යුත් CO₂ වායුව සමඟ ස්පර්ශව පවතින ජලය අන්තර්ගත වේ.

මෙම පද්ධතිය තුළ සමතුලිතතා ගණනාවක් ඇත. වායු කලාපයෙහි පවතින CO₂ සහ H₂O පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරේ නම් ඉහත පද්ධතියේ ඇති සමතුලිතතා ගණන වන්නේ,

- (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6 (5) 7

27. 1.0 moldm⁻³ NaOH 1.0 cm³ බැගින් එකතු කළ විට pH අගයෙහි වැඩිම වෙනස්වීමක් පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- (1) 1.0 moldm⁻³ CH₃COOH 20.0 cm³
 (2) 1.0 moldm⁻³ NaOH 20.0 cm³
 (3) 1.0 moldm⁻³ CH₃COOH 10.0 cm³ සහ 1.0 moldm⁻³ CH₃COONa 10.0 cm³ මිශ්‍රණයක්
 (4) 1.0 moldm⁻³ H₂SO₄ 20.0 cm³
 (5) ආසන්න ජලය 20.0 cm³

28.

- (i) NaOH සමඟ වැඩිපුර NaOH හි අද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයක් ලබා දෙන,
 (ii) NH₄OH සමඟ වැඩිපුර NH₄OH හි ද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයක් ලබා දෙන,
 කැටායනය පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක්ද?

- (1) Al³⁺ (2) Cr³⁺ (3) Zn²⁺ (4) Fe²⁺ (5) Cu²⁺

29. එක් පරීක්ෂණ නළයක 1 – hexyne ද තවත් පරීක්ෂණ නළයක 2 – hexyne ද අඩංගු වේ. 1 – hexyne සහ 2 – hexyne වෙන් වෙන් ව හඳුනාගැනීම සඳහා ඔබ එක් එක් පරීක්ෂා නළවලට එකතු කරන්නේ පහත දැක්වෙන ඒවායින් කවරක් ද?

- (1) තනුක H_2SO_4 සහ $HgSO_4$ (2) Br_2/CCl_4 (3) ක්ෂාරීය $KMnO_4$
 (4) ඇමෝනියම් $AgNO_3$ (5) ජලීය Na_2CO_3

30. පහත දී ඇති ඒවා අතුරෙන් ඕනෑ ම පරමාණු දෙකක් අතර සෑදිය හැකි බන්ධන සංයෝජනය වන්නේ,

- (1) σ බන්ධන දෙකක් සහ π බන්ධන එකක්
 (2) σ බන්ධන තුනක්
 (3) σ බන්ධන එකක් සහ π බන්ධන එකක්
 (4) π බන්ධන දෙකක්
 (5) σ බන්ධන දෙකක්

31. අදාළ ලවණයේ ජලීය ද්‍රාවණ සමඟ කරන ලද A සහ B පරීක්ෂා දෙක ම සඳහා නිවැරදි නිරීක්ෂණ අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් (1) – (5) දක්වා වූ තීරු අතුරෙන් කුමන තීරුවේ ද?

	(1) $AgNO_3$	(2) $Ba(NO_3)_2$	(3) $CdSO_4$	(4) $MgSO_4$	(5) $FeCl_3$
(A) තනුක HCl එකතු කිරීම	සුදු අවක්ෂේපය	අවක්ෂේපයක් නැත.	අවක්ෂේපයක් නැත.	සුදු අවක්ෂේපය	අවක්ෂේපයක් නැත.
(B) A පරීක්ෂාවෙන් ලද ද්‍රාවණය තුළින් H_2S යැවීම.	සුදු අවක්ෂේපය	සුදු අවක්ෂේපය	කළු අවක්ෂේපය	අවක්ෂේපයක් නැත.	අවක්ෂේපයක් නැත.

32. පහත දැක්වෙන ද්‍රාවණ සලකන්න.

- (a) 0.1 moldm^{-3} ජලීය NH_4Cl
 (b) 0.1 moldm^{-3} ජලීය NH_4OH
 (c) 0.2 moldm^{-3} ජලීය NH_4Cl 50.0 cm^3 ක් සහ 0.2 moldm^{-3} ජලීය NH_4OH 50.0 cm^3 ක් යන මේවායේ මිශ්‍රණයක්
 (d) 0.2 moldm^{-3} ජලීය NH_4OH 25.0 cm^3 ක් සහ 0.2 moldm^{-3} ජලීය ඇසිටික් අම්ල 25.0 cm^3 ක් යන මේවායේ මිශ්‍රණයක්

මෙම ද්‍රාවණවල pH අගයයන් අනුගමනය කරන පටිපාටිය වන්නේ,

- (1) $d < c < b < a$ (2) $a < b < c < d$ (3) $a < d < c < b$
 (4) $b < c < b < a$ (5) $b < c < a < d$

33. $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 1.0 dm^3 සහ $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ HCl}$ 1.0 dm^3 මිශ්‍රකර 2.0 dm^3 ක ද්‍රාවණයක් ලබා ගන්නා ලදී. මෙම තත්ත්ව යටතේ දී H_2SO_4 පූර්ණ ලෙස විසඳනය වී ඇත්නම්, ලැබුණු ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය වනුයේ,

- (1) 0.1 mol dm^{-3} (2) 0.15 mol dm^{-3} (3) 0.2 mol dm^{-3}
 (4) 0.3 mol dm^{-3} (5) 0.4 mol dm^{-3}


34. පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ඔක්සිකරණ - ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් වේ ද?

- (1) $2\text{CrO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (2) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
 (3) $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$ (4) $\text{Ca}(\text{COO})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{CO}$
 (5) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

35. ඇසිටමයිඩ් (CH_3CONH_2) සහ එතිල්ඇමීන් ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$) වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත දැක්වෙන කවර පරීක්ෂාව යොදා ගත හැකි ද ?

- (1) Br_2 ජලය එකතු කිරීම. (2) ජලීය NaOH සමඟ රත් කිරීම.
 (3) බ්‍රේඩ් ප්‍රතිකාරකය එකතු කිරීම. (4) තනුක HCl සමඟ රත් කිරීම.
 (5) ආම්ලික KMnO_4 සමඟ පිරියම් කිරීම.

36. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලියෙහි බාමර ශ්‍රේණියේ විමෝචන රේඛා පහත දක්වා ඇත.







A, B සහ C යන රේඛාවල වර්ණයන් වනුයේ පිළිවෙළින්,

- (1) රතු, කොළ, නිල් (2) නිල්, කොළ, රතු (3) කොළ, රතු, නිල්
 (4) නිල්, රතු, කොළ (5) රතු, නිල්, කොළ




37. විරූපනකාරකයක් ලෙස භාවිතා නොකරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- (1) NaOCl (2) KMnO_4 (3) තෙත් SO_2 (4) $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ (5) H_2O_2

38. X නම් කාබනික සංයෝගයක් නයිට්‍රස් අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර Y ලබා දේ. Y සංයෝගය ආම්ලික KMnO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර Z ලබා දේ. Z සංයෝගය ආම්ලික ඇල්කොහොලීය 2, 4-dinitrophenylhydrazine සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර තැඹිලි අවක්ෂේපයක් ලබා දේ. X සංයෝගය වන්නේ,



39. පහත දී ඇති සංයෝග සලකන්න.



පහත දැක්වෙන කවර සංයෝග යුගලය, තාප සුවිකාර්ය බහුඅවයවකයක් ලබා දෙන්නේ ද?

(1) A සහ B

(2) B සහ C

(3) C සහ D

(4) D සහ E

(5) E සහ A

40. X නම් කාබනික සංයෝගයක් සෝඩියම් සමඟ විලයනය කරන ලදී. විලයන මිශ්‍රණයේ ජලීය නිස්සාරකය පහත දැක්වෙන පරීක්ෂාවලට භාජනය කරන ලදී.

පරීක්ෂාව

නිරීක්ෂණය

(i) තනුක HNO_3 වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් සමඟ නටවා ජලීය AgNO_3 එකතු කිරීම.

වැඩිපුර NH_4OH හි අද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයක්



(ii) සෝඩියම් නයිට්‍රෝප්‍රසයිඩ් ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම.

දම්පාට වර්ණයක්

(iii) ජලීය FeSO_4 එකතු කිරීම.

කළු අවක්ෂේපයක්

X සංයෝගය වන්නේ,



අංක 41 සිට 50 දක්වා ප්‍රශ්නවලට උපදෙස්;


අංක 41 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නයේ දක්වා ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර හතර අතරින් එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි ය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර කවරේ දැයි තෝරා ගන්න.

- (a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මත ද
- (b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මත ද
- (c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මත ද
- (d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මත ද

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මත ද උත්තර පත්‍රයෙහි දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න.

උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) හා (b) පමණක් නිවැරදියි	(b) හා (c) පමණක් නිවැරදියි	(c) හා (d) පමණකා නිවැරදියි	(d) හා (a) පමණක් නිවැරදිය	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් නිවැරදියි

41. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමන එක/ඒවා සත්‍ය වේ ද?
- (a) ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට අංශුමය මෙන් ම තරංගමය ලක්ෂණ ද ඇත.
 - (b) ප්‍රෝටෝනයක්, නියුට්‍රෝනයකට වඩා බරින් වැඩි ය.
 - (c) සෑම පරමාණුවකම ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන ඇත.
 - (d) සෑම අයනයක ම එක් ප්‍රෝටෝනයක්වත් ඇත.
42. පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා වාලක අණුක වාද සමීකරණය $pV = \frac{1}{3}mNC^2$ වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක්/කුමන ඒවා පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා සත්‍ය වේ ද?
- (a) C^2 උෂ්ණත්වයෙන් ස්වායත්ත වේ.
 - (b) උෂ්ණත්වය නියත විට C^2 නියතයකි.
 - (c) උෂ්ණත්වය නියත විට pV නියතයකි.
 - (d) pV මවුල ප්‍රමාණයෙන් ස්වායත්ත වේ.
43. X සංයෝගය Sn සහ සාන්ද්‍ර HCl ඔක්සිහාරකය සමඟ පිරියම් කරන ලදී. ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණය ජලීය NaOH යොදමින් භාෂ්මික කරන ලදී. භාෂ්මිකරණයේ දී ලැබෙන කාබනික ඵලය වෙන් කර ගෙන, පළමුව නයිට්‍රස් අම්ලය සහ දෙවනුව 2 - නැග්තෝල් සමඟ පිරියම් කළ විට රතු පාටට හුරු තැඹිලි පාට සායමක් ලැබුණි. X සඳහා පහත දැක්වෙන කවර ව්‍යුහය/ව්‍යුහ ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය හා ගැලපෙන්නේ ද?



44. තාත්වික වායු පරිපූර්ණ නොවන බවට සාක්ෂි වශයෙන් ගත හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?
- (a) විවිධ තාත්වික වායුවලට වෙනස් තාපාංක ඇත.
 (b) සමහර තාත්වික වායු වර්ණවත් වන අතර අනෙක් ඒවා අවර්ණ වේ.
 (c) එකම තත්ව යටතේ විවිධ තාත්වික වායුවල ඝනත්ව වෙනස් අගයන් ගනී.
 (d) සමහර තාත්වික වායු එකිනෙක සමඟ රසායනික ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
45. SO_2 සහ CO_2 වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ද්‍රාවණවලින් කුමක්/කුමන ඒවා භාවිත කළ නොහැකි වේද?
- (a) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ (b) KMnO_4 (c) ලිට්මස් ද්‍රාවණය (d) FeCl_3/H^+
46. උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගනිමින් ප්‍රතික්‍රියාවල සාන්ද්‍රණය වැඩි කළ විට ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වන්නේ,
- (a) අණු අතර සංඝට්ටන සංඛ්‍යාව වැඩි වන නිසා ය.
 (b) සක්‍රියත ශක්තියට වඩා ශක්තිය ඇති අණු භාගය වැඩි වන නිසාය.
 (c) සංඝට්ටනවල ශක්තිය වැඩි වන නිසා ය.
 (d) නිවැරදි ජ්‍යාමිතියෙන් යුතු ව සිදු වන සංඝට්ටන භාගය වැඩි වන නිසා ය.
47. $\text{P}|\text{P}^+$ සහ $\text{Q}|\text{Q}^{2+}$ යන ලෝහ/ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකෙහි සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව පිළිවෙලින් 0.80 V සහ -0.44 V වේ. පහත ප්‍රතික්‍රියාවලින් කුමක්/කුමන ඒවා , ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව හා ගැලපේ ද?
- (a) $2\text{P}(\text{s}) + \text{Q}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{P}^+(\text{aq}) + \text{Q}(\text{s})$ (b) $\text{Q}(\text{s}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{Q}^{2+}(\text{aq})$
 (c) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{P}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow 2\text{P}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (d) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{P}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{POH}(\text{aq})$
48. නළ ලිදක ජලය පිටතට පොම්ප කළ විගස පැහැදිලිව ඇති නමුත් , වාතයට විවෘත ව ටික වේලාවක් තැබූ විට, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ සෑදීම නිසා දුඹුරු සහ අපැහැදිලි බවට පත් වේ. මෙම තත්වය කෙරෙහි වඩාත් ම සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ ද?
- (a) පීඩනය යටතේ, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ජලයේ ද්‍රාවණය වන නමුත්, වායුගෝලීය පීඩනයේ දී තැන්පත් වේ.
 (b) ලිදට සැපයෙන ජලයේ යකඩ ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් Fe^{2+} ලෙසටය.
 (c) පොළොව යට පවතින තත්ව ඔක්සිහාරක වේ.
 (d) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ හි ද්‍රාව්‍යතාවය, $\text{Fe}(\text{OH})_2$ හි ද්‍රාව්‍යතාවයට වඩා බෙහෙවින් අඩු ය.
49. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක්/කුමන ඒවා 25°C දී සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක්/ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස සැලකිය හැකි ද?
- (a) $\text{HCl}(\text{aq}) (1.0 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{Pt} | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ atm})$
 (b) $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) (1.0 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{Pt} | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ atm})$
 (c) $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) (1.0 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{Pt} | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ atm})$
 (d) $\text{HNO}_3(\text{aq}) (1.0 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{Pt} | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ atm})$

50. S යනු Na_2CO_3 සහ NaHCO_3 හි ජලීය ද්‍රාවණයකි. S ද්‍රාවණයෙන් 25.0 cm^3 , සම්මත HCl ද්‍රාවණයක්, සමග අනුමාපනය කිරීමෙන් S හි අඩංගු Na_2CO_3 සහ NaHCO_3 වල සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන ක්‍රමය/ක්‍රම යොදා ගත හැකි ද?
- (a) දර්ශකය ලෙස පිනොලීප්තැලීන් භාවිත කිරීමෙන්
 - (b) පළමුව මීතයිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකය ලෙස භාවිත කර ඉන් පසු එම ද්‍රාවණයට ම පිනොලීප්තැලීන් එකතු කර තවදුරටත් අනුමාපනය කිරීමෙන්
 - (c) පළමුව පිනොලීප්තැලීන් දර්ශකය ලෙස භාවිතා කර ඉන් පසු එම ද්‍රාවණයට ම මීතයිල් ඔරෙන්ජ් එක්කර තවදුරටත් අනුමාපනය කිරීමෙන්
 - (d) දර්ශකය ලෙස පිනොලීප්තැලීන් භාවිතා කර අනුමාපනයෙන් පසු S ද්‍රාවණයෙන් තවත් 25.0 cm^3 කොටසක් මීතයිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකය එක්කර අනුමාපනය කිරීමෙන්

• අංක 51 සිට 60 දක්වා ප්‍රශ්නවලට උපදෙස්:

අංක 51 සිට 60 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ප්‍රකාශ දෙක බැගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම ප්‍රකාශ යුගලයට හොඳින්ම ගැලපෙනුයේ පහත වගුවෙහි දැක්වෙන (1), (2), (3), (4) සහ (5) යන ප්‍රතිචාරවලින් කවර ප්‍රතිචාරය දැයි තෝරා උචිත ලෙස ලකුණු කරන්න.

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
(1)	සත්‍ය ය.	සත්‍යය වන අතර පළමුවැන්න නිවැරදිව පහදා දෙයි
(2)	සත්‍ය ය.	සත්‍යය වන නමුත් පළමුවැන්න නිවැරදිව පහදා නොදෙයි
(3)	සත්‍ය ය.	අසත්‍ය ය.
(4)	අසත්‍ය ය.	සත්‍ය ය.
(5)	අසත්‍ය ය.	අසත්‍ය ය.

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
51. එතිල්ඇමීන් HNO_2 සමඟ ස්ථායී ඩයසෝනියම් ලවණයක් නොදේ.	HNO_2 ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ ඇරෝමැටික ඇමීන් සමඟ පමණ ය.
52. දෙන ලද තත්ත්ව යටතේ දී උත්ප්‍රේරකයක් මගින්, යම් ප්‍රතික්‍රියාවක ඒකක කාලයක දී ලැබෙන ඵල ප්‍රමාණය වැඩි කරයි.	උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය වෙනස් කරයි.
53. CH_4 සහ CO_2 හරිතාගාර වායු වේ.	හරිතාගාර වායු යනු කාබන් අඩංගු කුඩා අණුවලින් සමන්විත වායුන් ය.
54. එක ම උෂ්ණත්වයක දී එක ම ශීඝ්‍රතාවෙන් සිදුවන වෙනස් ප්‍රතික්‍රියා දෙකක සක්‍රියන ශක්ති සම විය යුතු ය.	ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය සක්‍රියන ශක්තියට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

<p>55. ආම්ලික KMnO_4 සමඟ ප්‍රකාශ සක්‍රිය 2 – බියුටනෝල් ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ලැබෙන කාබනික ඵලය ප්‍රකාශ සක්‍රිය නොවේ.</p>	<p>කාබනික ඵලය රැසිමික මිශ්‍රණයක් වේ.</p>
<p>56. ජලයෙහි ද්‍රාවණය වූ Cl_2 වායුව ද්‍රාවණය නැටවීමෙන් ඉවත් කළ හැකි ය.</p>	<p>ජලයෙහි Cl_2 ද්‍රාවණය වීම කාපදායක මෙන් ම ප්‍රත්‍යාවර්ත ද වේ.</p>
<p>57. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ රත් කළ විට අවර්ණ වේ.</p>	<p>විජලනයේ දී Cu^{2+} අයන Cu^+ අයන බවට ඔක්සිහරණය වේ.</p>
<p>58. ICl_4^- අයනය චතුෂ්තලීය වේ.</p>	<p>ICl_4^- හි අයඩීන් පරමාණුව වටා විකර්ෂණ ඒකක හතරක් ඇත.</p>
<p>59. NH_4^+ අයනයේ එක් N – H බන්ධනයක ලක්ෂණ අනෙක් N – H බන්ධන තුනේ ලක්ෂණවලට වඩා වෙනස් වේ.</p>	<p>NH_4^+ අයනයේ එක් N – H බන්ධනයක් දායක බන්ධනයක් (සංගත බන්ධනයක්) ලෙස හඳුනාගත හැකි ය.</p>
<p>60. ශීඝ්‍ර මගින් ග්ලූකෝස් පැසවීමේ දී ග්ලූකෝස් ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) අණුවේ සමහර කාබන් පරමාණු ඔක්සිකරණය වන අතර තවත් ඒවා ඔක්සිහරණය වේ.</p>	<p>ග්ලූකෝස් පැසවීමේ රසායනික ඵල ලෙස ලැබෙන්නේ CO_2 සහ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ය.</p>